

UTE[®]C 46

Ureia granulada com o inibidor da urease NBPT

ADUBO CE

UREIA GRANULADA (46% N) COM O INIBIDOR DA UREASE NBPT

46 % Azoto (N) total
46 % Azoto (N) amídico

Densidade aparente: 0,7 - 0,78 t/m³
Análise granulométrica: 90% entre 2,0 mm e 5,0 mm
Tamanho medio grão: 3,0-3,6 mm
pH em solução (100g/L, 20 °C) 9,0 – 9,5

Massa líquida: 500 kg

Doses orientativas de adubação:

Cultura	Dose (kg/ha)	Época de aplicação
Cereais	200–300	Em cobertura, antes do afilhamento
Milho	300–600	Em cobertura cedo, antes das 3-6 folhas
Arroz	250-350	Em fundo e/ou em cobertura
Algodão	100-150	Em cobertura
Olival	150-200	Em cobertura
Girassol	150-200	Em cobertura

Todas estas recomendações são orientativas. Será por isso necessário conhecer, com antecedência, a produção esperada, o estado fenológico da cultura, densidade de plantação,... assim como a acompanhar toda esta informação, se for possível, análise de solo, foliar e da água de rega, com o fim de ajustar melhor a nossa recomendação de adubação.

P102 Manter fora do alcance das crianças
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização

®=Marca registada de EuroChem Agro